

SPORIAL

PRÉSENTATION

Liquide marron foncé.

OBJECTIFS NUTRITIONNELS

A utiliser dès la rentrée des animaux jusqu'au vêlage pour atténuer les réactions au stress lié à la concentration, la fin de gestation et de vêlage sur le transit digestif et intestinal.

Atténue les réactions au stress dues au développement des parasites internes, notamment les protozoaires comme les caryosporidies.

COMPOSITION

Oligo - éléments (mg au litre) :

Zinc (sulfate de) :	9.000	Manganèse (sulfate de) :	10.000
Fer (sulfate de) :	7.500	Cuivre (sulfate de) :	7.500
Cobalt (sulfate de) :	200	Magnésium (chlorure de) :	4.000
		Sélénium (sélénite de soude) :	5

Mélange de substances aromatiques et apéritives.

MODE D'EMPLOI

Distribution individualisée : dans les 21 jours qui précèdent le vêlage, 0,08 g / kg de poids vif, soit environ 50 ml par tête et par jour pour une vache de 600 kg.

Distribution collective : afin de respecter les normes d'homogénéité de mélange, 100 ml par tête et par jour, un jour sur deux- trois semaines avant vêlage.

Veaux : A utiliser juste après le vêlage pour atténuer les réactions au stress lié à l'adaptation du système digestif et intestinal du veau au milieu ambiant.

Distribution individualisée : 30 ml en une prise par jour, pendant trois jours dès le premier jour de mise bas.

Recommandation

Afin de bénéficier de l'impact lié à la concentration des animaux, il est important de distribuer en même temps à tout le troupeau et à la descendance après vêlage.

PRÉCAUTION

Agiter avant l'emploi.

CONSERVATION

3 ans dans son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

1 litre - 5 litres - 25 litres



NUTRAL

« mieux vaut prévenir
que guérir »